

Тестовые задания

Выберите один правильный ответ:

1. Случай COVID-19 считается подтвержденным при

- 1) клинических проявлениях тяжелой пневмонии
- 2) положительном результате лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 с применением методов амплификации нуклеиновых кислот вне зависимости от клинических проявлений
- 3) наличии острого респираторного дистресс-синдрома
- 4) отрицательном результате лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 с применением методов амплификации нуклеиновых кислот вне зависимости от клинических проявлений

2. Медицинский работник в очаге новой коронавирусной инфекции COVID-19 должен использовать СИЗ

- 1) шапочка, противочумный (хирургический) халат, предварительно обработав руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами.
- 2) противочумный (хирургический) халат, медицинская маска
- 3) шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор класса защиты FFP2 или FFP3, предварительно обработав руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами.
- 4) шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор класса защиты FFP2 или FFP3

3. Медицинские отходы, в том числе биологические выделения пациентов с COVID-19 (мокрота, моча, кал и др.), утилизируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами класса

- 1) А 2) Б 3) Г 4) В

4. Респиратор снимают

- 1) за резинки (сначала снимая нижнюю резинку, затем верхнюю), не касаясь наружной и внутренней поверхности полумаски респиратора
- 2) в перчатках за резинки (сначала снимая верхнюю резинку, затем нижнюю), не касаясь наружной и внутренней поверхности полумаски респиратора
- 3) в перчатках за резинки (сначала снимая нижнюю резинку, затем верхнюю), не касаясь наружной поверхности полумаски респиратора
- 4) в перчатках за резинки (сначала снимая нижнюю резинку, затем верхнюю), не касаясь наружной и внутренней поверхности полумаски респиратора

5. За членами бригады, проводившей медицинскую эвакуацию пациента с COVID 2019, устанавливается наблюдение на срок

- 1) 21 дней
- 2) 14 дней

- 3) не устанавливается наблюдение
- 4) 7 дней

6. Пути передачи коронавирусной инфекции

- 1) воздушно – капельный
- 2) воздушно – пылевой
- 3) контактно – бытовой
- 4) все верно

7. В медицинских организациях использованные одноразовые медицинские изделия (средства индивидуальной защиты) в очаге COVID 2019

- 1) подлежат обеззараживанию и утилизации как отходы класса Б
- 2) подлежат обеззараживанию и утилизации как отходы класса В
- 3) не подлежат обеззараживанию и утилизации как отходы класса А
- 4) подлежат обеззараживанию и утилизации как отходы класса Д

8. Раствор для обработки полости рта при попадании крови COVID-19 инфицированного пациента

- 1) 70% этиловый спирт;
- 2) 45% этиловый спирт;
- 3) 20% этиловый спирт;
- 4) 3% перекись водорода

9. Дезинфекция в очаге новой коронавирусной инфекции COVID-19 это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение

- 1) вирусов SARS CoV-2
- 2) грызунов
- 3) насекомых
- 4) членистоногих

10. Варианты клинического течения коронавирусной инфекции

- 1) ОРВИ, пневмония без ОДН или с ОДН, инфекционно - токсический шок
- 2) только ОРВИ
- 3) только острый бронхит
- 4) только острый риносинусит

11. Исследование газов артериальной крови с определением PaO_2 , $PaCO_2$, pH, бикарбонатов, лактата рекомендуется

- 1) всем пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19
- 2) пациентам с SpO_2 в пределах 90-95% (по данным пульсоксиметрии)
- 3) пациентам с SpO_2 менее 90% (по данным пульсоксиметрии)
- 4) не рекомендуется

12. Механический метод дезинфекции в очаге новой коронавирусной инфекции COVID-19

- 1) кипячение
- 2) обжигание
- 3) пастеризация
- 4) протираание

13. После выздоровления пациента с COVID-19 производят дезинфекцию установленного вида

- 1) профилактическую
- 2) заключительную
- 3) текущую
- 4) предварительную

14. Индивидуальные антисептические мероприятия, осуществляемые медицинским работником, выявившим больного с подозрением на коронавирус COVID-19

- 1) рот и горло прополаскивать 70% этиловым спиртом
- 2) обработать открытые части тела кожным антисептиком
- 3) в нос и в глаза закапать 20 % сульфацил натрия
- 4) в нос и в глаза закапать 1% раствор борной кислоты

15. Медицинский персонал бригады скорой медицинской помощи, выполняющий вызов к больным с подозрением на коронавирус COVID-19, меняет средства индивидуальной защиты

- 1) каждые 8 часов
- 2) после каждого больного
- 3) один раз за смену
- 4) не меняет

16. Средняя длительность инкубационного периода коронавирусной COVID-19 инфекции

- 1) 3-7 дней
- 2) 21 день
- 3) 1-2 дня
- 4) 6 мес.

17. Дезинфекции после доставки больного в подозрением на инфекцию COVID-19 подвергается

- 1) все верно
- 2) одноразовые средства индивидуальной защиты
- 3) предметы, использованные при медицинской эвакуации
- 4) автомобиль скорой медицинской помощи

18. Иммуитет при инфекциях, вызванных коронавирусами

- 1) 7-10 лет
- 2) пожизненный

- 3) 3-5 лет
- 4) нестойкий, возможно повторное заражение

19. Раствор для обработки слизистой носа при аварийной ситуации в очаге новой коронавирусной инфекции COVID-19:

- 1) перекись водорода
- 2) сульфат натрия
- 3) камфорный спирт
- 4) этиловый спирт

20. Водитель транспортного средства, в котором осуществляется медицинская эвакуация пациента с COVID-19 использует

- 1) маску и перчатки
- 2) респиратор FFP2 или FFP3
- 3) одноразовый хирургический халат
- 4) защитный комбинезон, респиратор FFP2 или FFP3, перчатки, очки

21. Мазок из носоглотки или ротоглотки (зева) берется

- 1) стерильным тампоном, который после взятия материала помещается в контейнер для транспортировки
- 2) стерильным тампоном, который после взятия материала помещается в стерильную пластиковую пробирку без транспортной средой
- 3) не стерильным тампоном, который после взятия материала помещается в пробирку с транспортной средой
- 4) стерильным тампоном, который после взятия материала помещается в стерильную пластиковую пробирку с транспортной средой

22. Медицинский работник должен использовать СИЗ

- 1) шапочка, противочумный (хирургический) халат, предварительно обработав руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами.
- 2) противочумный (хирургический) халат, медицинская маска
- 3) шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор класса защиты FFP2 или FFP3, предварительно обработав руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами.
- 4) шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор класса защиты FFP2 или FFP3

23. Естественными хозяевами большинства известных в настоящее время коронавирусов являются

- 1) рыбы
- 2) моллюски
- 3) млекопитающие
- 4) членистоногие

24. После смерти пациента от COVID-19 производят дезинфекцию установленного вида

- 1) профилактическую
- 2) заключительную
- 3) текущую
- 4) предварительную

25. Порядок снятия одноразового защитного комбинезона.

- 1) перчатки, бахилы, комбинезон, шлем, маска, очки, перчатки
- 2) бахилы, комбинезон, шлем, очки, маска, перчатки
- 3) перчатки, бахилы, комбинезон, шлем, очки, маска, перчатки
- 4) перчатки, бахилы, шлем, комбинезон, очки, маска, перчатки